

BASE ELISIR CREMA

*Gelato fiordilatte tradizionale,
preparato con classica base 100*

VALORI NUTRIZIONALI MEDI per 100 g	
Kcal	176
kJ	736
GRASSI	7,50
-di cui saturi	5,20
-di cui insaturi	2,40
CARBOIDRATI	22,80
-di cui zuccheri	22,25
-di cui polioli	0,00
PROTEINE	3,85
FIBRE	0,70
SALE	0,13

*Gelato fiordilatte preparato
con Base Elisir crema*

VALORI NUTRIZIONALI MEDI per 100 g	
Kcal	123
kJ	514
GRASSI	5,95
-di cui saturi	3,70
-di cui insaturi	2,25
CARBOIDRATI	22,70
-di cui zuccheri	4,99
-di cui polioli	14,85
PROTEINE	4,10
FIBRE	3,20
SALE	0,20

Rispettando l'ingredientistica e le proporzioni consigliate in ricetta è possibile garantire i seguenti claim nutrizionali e salutistici, applicabili al prodotto finito realizzato con Base Elisir crema:

Claim per gelato finito	
Senza zuccheri aggiunti (contiene in natura zuccheri)	-
A ridotto contenuto di zuccheri	 L'assunzione di alimenti/bevande contenenti eritritolo, maltitolo, polidestrosio, sorbitolo anziché zucchero induce un minore aumento del glucosio ematico dopo la loro assunzione rispetto agli alimenti/bevande contenenti zucchero.
A ridotto contenuto calorico	-
Fonte di fibre	-

BASE ELISIR FRUTTA

*Sorbetto alla fragola tradizionale,
preparato con classica base 50 (50% frutta)*

*Sorbetto alla fragola preparato
con Base Elisir frutta (50% frutta)*

VALORI NUTRIZIONALI MEDI per 100g	
Kcal	117
kJ	488
GRASSI	0,18
-di cui saturi	0,08
-di cui insaturi	0,10
CARBOIDRATI	28,60
-di cui zuccheri	25,39
-di cui polioli	0,00
PROTEINE	0,35
FIBRE	2,05
SALE	0,02

VALORI NUTRIZIONALI MEDI per 100g	
Kcal	53
kJ	223
GRASSI	0,11
-di cui saturi	0,01
-di cui insaturi	0,10
CARBOIDRATI	25,60
-di cui zuccheri	2,50
-di cui polioli	20,50
PROTEINE	0,38
FIBRE	1,74
SALE	0,10

Rispettando l'ingredientistica e le proporzioni consigliate in ricetta è possibile garantire i seguenti claim nutrizionali e salutistici, applicabili al prodotto finito realizzato con Base Elisir frutta:

Claim per gelato finito	
Senza zuccheri aggiunti (contiene in natura zuccheri)	-
A ridotto contenuto di zuccheri (<u>ad eccezione di datteri, castagne e frutta essiccata</u>)	L'assunzione di alimenti/bevande contenenti eritritolo, maltitolo, polidestrosio, sorbitolo anziché zucchero induce un minore aumento del glucosio ematico dopo la loro assunzione rispetto agli alimenti/bevande contenenti zucchero.
A ridotto contenuto calorico	-
Fonte di fibre	-
Senza grassi	-